

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HEMINEVRIN 300 mg

měkké tobolky
(clomethiazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete HEMINEVRIN 300 mg používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je HEMINEVRIN 300 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HEMINEVRIN 300 mg užívat
3. Jak se HEMINEVRIN 300 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak HEMINEVRIN 300 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co je HEMINEVRIN 300 mg a k čemu se používá

HEMINEVRIN 300 mg obsahuje léčivou látku klomethiazol. Tato léčivá látka patří do skupiny léčiv, která se označují jako hypnotika nebo sedativa. HEMINEVRIN 300 mg má ulidňující účinek na Vaši nervovou soustavu.

HEMINEVRIN 300 mg se používá k:

- léčbě pocitu neklidu a nabuzenosti (agitovanost).
- léčbě nespavosti, pokud nemůžete usnout.
- odstranění příznaků při odvykání pití alkoholu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete HEMINEVRIN 300 mg užívat

Neužívejte přípravek HEMINEVRIN 300 mg

- Jestliže jste alergický(á) na klomethiazol nebo na kteroukoliv složku přípravku.
- Jestliže máte plicní problémy nebo dýchací obtíže (akutní plicní nedostatečnost).

Zvláštní opatření při použití HEMINEVRIN 300 mg je zapotřebí

- Jestliže máte problémy s játry.
- Jestliže jste někdy přestal(a) dýchat v průběhu spánku. Tento jev se označuje jako „spánková apnoe“.
- Jestliže máte obtíže s dýcháním (chronická plicní nedostatečnost).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

- cimetidin (užívaný k léčbě žaludečních vředů a pálení žáhy).
- karbamazepin (k léčbě úzkosti, epilepie a poruch nálady).
- chloroxazon (k úlevě od svalových křečí v zádech i jinde).
- propranolol (k léčbě vysokého krevního tlaku a problémů se srdcem, např. angina pectoris).

Užívání přípravku HEMINEVRIN 300 mg s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem HEMONEVRIN nepijte alkohol. Kombinace alkoholu a přípravku HEMINEVRIN 300 mg by Vám mohla uškodit. Pokud potřebujete více informací, zeptejte se Vašeho lékaře. HEMINEVRIN 300 mg užívejte vždy před jídlem nebo vždy po jídle.

Těhotenství a kojení

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Předtím než začnete užívat HEMINEVRIN 300 mg, informujte lékaře, že jste těhotná, můžete být těhotná nebo že kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřídte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje, když užíváte HEMINEVRIN 300 mg. HEMINEVRIN 300 mg může vyvolat ospalost.

Důležité informace o některých složkách přípravku HEMINEVRIN 300 mg

Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, řekněte o tom ošetřujícímu lékaři předtím, než začnete užívat HEMINEVRIN 300 mg.

3. Jak se HEMINEVRIN 300 mg užívá

Vždy užívejte HEMINEVRIN 300 mg přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poradte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informace zaznamenané na krabičce léku Vám připomenou, co lékař říkal. Bude tam zaznamenáno kolik tobolek a jak často je máte užívat. Neužívejte více tobolek než předepsal lékař. Tobolky se polykají celé.

Obvyklá dávka přípravku závisí na tom, kvůli čemu (jaké diagnóze) HEMINEVRIN 300 mg užíváte.

Pokud se probouzíte v průběhu noci, obvykle se užívají 1-2 tobolky před spaním.

Pokud pociťujete neklid a nabuzenost, obvykle se užívá 1 tobolka třikrát denně.

Pokud se chcete zbavit závislosti na alkoholu, lékař Vám předepíše na počátku léčby vyšší dávku, obvykle 2-4 tobolky, které se užívají vždy po několika hodinách. Postupně bude lékař předepsanou dávku snižovat. Neužívejte HEMINEVRIN 300 mg po dobu delší než Vám předepsal lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku HEMINEVRIN 300 mg, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tobolek než jste měl(a), informujte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice a vezměte s sebou Váš lék.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HEMINEVRIN 300 mg

Pokud jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, vyčkejte až do této doby a pokračujte již normálně. Nezdvojujte dávku za dávku vynechanou.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i HEMINEVRIN 300 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Těžké alergické reakce na přípravek jsou vzácné. Pokud se rozvine těžká alergická reakce, přestaňte užívat HEMINEVRIN 300 mg a okamžitě kontaktujte lékaře. Příznaky takové reakce mohou zahrnovat:

- výsev vyrážky někdy podobné planým neštovicím, svědění kůže
- tvorbu puchýřků
- otok obličeje, rtů, jazyka nebo i jiných částí těla
- dušnost, hvízdání a obtížný nádech

Další možné nežádoucí účinky:

- štípání v nose a ucpaný nos
- rýma a zvýšená tvorba hlenu v průduškách
- zánět a pálení v očích
- bolest hlavy
- snížený krevní tlak
- kožní vyrážka, která může svědit
- změny srdečního rytmu
- obtížné dýchání
- zhoršení funkce jater, které může vest k zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- alergické reakce
- dlouhodobá léčba může vest k závislosti na tomto léku

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak HEMINEVRIN 300 MG uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

HEMINEVRIN 300 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu - krabičce/lahvičce (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co HEMINEVRIN 300 mg obsahuje

Léčivou látkou je klomethiazol. Jedna tobolka obsahuje 192 mg klomethiazolu.

Pomocnými látkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, želatina, glycerol 85%, sorbitol-mannitol-oligosacharidy, oxid titaničitý (E 171) a hnědý oxid železitý (E 172).

Jak HEMINEVRIN 300 mg vypadá a co obsahuje toto balení

HEMINEVRIN 300 mg jsou měkké šedobéžové tobolky. Jedno balení obsahuje 100 tobolek v hnědé lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

Výrobce

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

Tel.: 222 807 111

Fax: 222 807 221

www.astrazeneca.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.10.2009

Překlad zkratk uvedených na anglickém obalu:

MAN = datum výroby

EXP = Použitelné do:

LOT = Číslo šarže